

## 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-NBT法说明书

(货号: ADS-F-KY001-96 分光法 96样)

有效期: 3个月

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

### 测定意义:

SOD (EC 1.15.1.1) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中, 催化超氧化物阴离子发生歧化作用, 生成  $H_2O_2$  和  $O_2$ 。SOD 不仅是超氧化物阴离子清除酶, 也是  $H_2O_2$  主要生成酶, 在生物抗氧化系统中具有重要作用。

### 测定原理:

通过黄嘌呤及黄嘌呤氧化酶反应系统产生超氧阴离子( $O_2^{\cdot-}$ ),  $O_2^{\cdot-}$ 可还原氮蓝四唑生成蓝色甲贓, 后者在 560nm 处有吸收; SOD 可清除  $O_2^{\cdot-}$ , 从而抑制了甲贓的形成; 反应液蓝色越深, 说明 SOD 活性愈低, 反之活性越高。

### 需自备的仪器和用品:

可见分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水

### 试剂的组成和配制:

提取液: 液体 100mL×1 瓶, 4℃ 保存;

试剂一: 液体 30mL×1 瓶, 4℃ 保存;

试剂二: 液体 6mL×10 瓶, -20℃ 保存;

试剂三: 液体 350uL×2 支, -20℃ 保存;

试剂四: 液体 10mL×2 瓶, 4℃ 保存。

### 粗酶液提取:

#### 1、细菌、细胞或组织样品的制备:

细菌或培养细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量 ( $10^4$  个): 提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液), 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 8000g 4℃ 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

组织: 按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液), 进行冰浴匀浆。8000g 4℃ 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

#### 2、血清 (浆) 样品: 直接检测。

### 测定步骤:

- 1、分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 560nm, 蒸馏水调零。
- 2、测定前将试剂一、二和四在 37℃ (哺乳动物) 或 25℃ (其他物种) 水浴 5min 以上。
- 3、样本测定 (在 EP 管中依次加入下列试剂):

试剂名称 (uL)	测定管	对照管
试剂一	240	240
试剂二	510	510
试剂三	6	6
样品	90	

试剂四	180	180
双蒸水		90

充分混匀，室温静置 30min 后，加入 1mL 玻璃比色皿，560nm 处测定各管吸光值 A。

### 注意事项：

- 1、试剂三为酶，使用时在冰上放置。
- 2、若样本量较多，测定前可将试剂一、二和四按照 240 μL:510 μL:180 μL 比例混成一个混合液（需依据当次检测的样本数量混合对应的试剂量），每比色皿务必最后一步加 930 μL 该混合液。
- 3、对照管只需要做一管。
- 4、SOD 为什么有的样本测定管大于对照管？

对照管吸光值过低可能是反应时间不够，可以延长反应时间（反应时间 30min 可以延长到 40min）。若出现测定管大于对照管，可能是样本中杂质的影响太大，为了降低杂质的影响一般将样本提取上清液用蒸馏水或提取液稀释 10 倍后再测，通常可以使测定正常。计算公式中乘以相应稀释倍数。

### SOD 活性计算：

#### 1、抑制百分率的计算

抑制百分率=(A 对照管-A 测定管)÷A 对照管×100%

尽量使样本的抑制百分率在 40-70%范围内。如果计算出来的抑制百分率小于 40%或大于 70%，则通常需要调整加样量后重新测定。如果测定出来的抑制百分率偏高，则需将样本用提取液适当稀释；如果测定出来的抑制百分率偏低，则需重新准备浓度比较高的待测样本。

2、SOD 酶活性单位：在上述黄嘌呤氧化酶耦联反应体系中抑制百分率为 50%时，反应体系中的 SOD 酶活力定义为一个酶活力单位(U/mL)。

#### 3、SOD 酶活性计算：

(1) 血清（浆）SOD 活性(U/mL)=[抑制百分率÷(1-抑制百分率)×V 反总]÷V 样  
=11.4×抑制百分率÷(1-抑制百分率)

(2) 组织、细菌或培养细胞 SOD 活力计算：

##### a. 按样本蛋白浓度计算

SOD 活性(U/mg prot)=[抑制百分率÷(1-抑制百分率)×V 反总]÷(V 样×Cpr)  
=11.4×抑制百分率÷(1-抑制百分率)÷Cpr

需要另外测定，建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。

##### b. 按样本鲜重计算

SOD 活性(U/g 鲜重)=[抑制百分率÷(1-抑制百分率)×V 反总]÷(W×V 样÷V 样总)  
=11.4×抑制百分率÷(1-抑制百分率)÷W

##### c. 按细菌或细胞个数计算

SOD 活力(U/10<sup>4</sup> cell)=[抑制百分率÷(1-抑制百分率)×V 反总]÷(500×V 样÷V 样总)  
=0.0228×抑制百分率÷(1-抑制百分率)

V 反总：反应体系总体积，1.026mL；V 样：加入反应体系中样本体积，0.09mL；V 样总：加入提取液体积，1 mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g；500：细胞或细菌总数，500 万。