

Acr-Bis 粉剂(40%,19:1)

产品简介

丙烯酸胺:亚甲基双丙烯酸胺溶液又称 Acr-Bis, 最常用的是 30%Acr-Bis(29:1) 即为含 30%Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液,其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1, 丙烯酸胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(40%,19:1)也是很常用的溶液, 其 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 19:1, 丙烯酸胺总量为 40%。Acr-Bis 粉剂(40%,19:1)常用于配制丙烯酸胺凝胶(PAGE 胶)如 SDS-PAGE 胶等, 可用于蛋白或核酸的分离, 溶解于去离子水或蒸馏水即可。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS037E0	Storage
	Acr-Bis 粉剂(40%,19:1)		1L
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、取 Acr-Bis 粉剂(40%,19:1), 充分溶解于适量的去离子水或蒸馏水中, 补水至终体积为 1L, 配制成溶液后应 4℃避光保存, 6 个月有效。
- 2、如果难以溶解, 可置于 50℃水浴, 如有大量沉淀, 应过滤后使用。

注意事项

- 1、Acr-Bis 粉剂(40%,19:1)对人体有一定刺激性, 请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。