

RIPA 裂解液(强)

产品简介

多种成分均可以从细胞中提取总蛋白，例如 Triton、SDS、NP-40 等，RIPA 裂解液(强)(Enhanced RIPA Lysis Buffer)是采用一种经典的细胞组织快速裂解，并获得总蛋白的裂解液，其裂解强度大于 NP-40 裂解液、RIPA 裂解液(中)，所获得的蛋白质可以用于 Western，免疫沉淀(Immunol Precipitation, IP)等。

Enhanced RIPA Lysis Buffer 主要由 Tris、NP-40、sodium deoxycho late 等组成，并含有多种蛋白酶抑制剂成分，可以有效抑制蛋白的降解，并维持原有的蛋白间相互作用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS0008S0	Storage
试剂(A): Enhanced RIPA Lysis Buffer	100ml	4°C	
试剂(B): PMSF 溶液(100mM)	1.5ml	-20°C	
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考)

配制含有 PMSF 的 Enhanced RIPA Lysis Buffer：取 Enhanced RIPA Lysis Buffer 置于室温平衡，加入 PMSF，使其终浓度为 1mM，临用前配制，不可长期保存。

(一)贴壁细胞

- 去除贴壁细胞的培养液，用 PBS、NS 或无血清培养液清洗 1 次，低速离心，弃上清，留取沉淀。
- 6 孔板每孔加入 150 ~ 250μl 含有 PMSF 的 Enhanced RIPA Lysis Buffer，用手指轻弹细胞，使其松散，移液器轻轻吹打，使裂解液和细胞充分接触，置于冰上或 4°C 裂解，通常裂解液作用于细胞 1 ~ 3s 内细胞就会被裂解，通常 6 孔板每孔细胞加入 150μl 裂解液已经足够，但如果细胞密度非常高可以适当加大裂解液的用量到 200 ~ 250μl。
- 10000 ~ 12000g 4°C 离心 5 ~ 10min(如无低温离心机，室温离心亦可)，取上清。
- 后续的 SDS-PAGE、Western、免疫沉淀和免疫共沉淀等操作。

(二)悬浮细胞

- 低速离心悬浮细胞，弃上清，用 PBS、NS 或无血清培养液清洗 1 次，离心留取沉淀。
- 下同贴壁细胞 2 ~ 4 操作步骤。

(三)组织样本

- 1、组织剪碎，越小越好。
- 2、放置液氮或超低温冰箱中冷冻 30min，用液氮研磨，尽量控制在 1~2min 之内以减少蛋白的降解，每 20mg 组织加入 150~250μl 含有 PMSF 的 Enhanced RIPA Lysis Buffer，冰上或 4°C 裂解 15~30min。
- 3、亦可按照每 20mg 组织加入 150~250μl 含有 PMSF 的 Enhanced RIPA Lysis Buffer，用玻璃匀浆器或组织研磨器匀浆，直至充分裂解，该过程尽量控制在 2~5min 以减少蛋白的降解。
- 4、下同贴壁细胞 2~4 操作步骤。

注意事项

- 1、去除贴壁细胞的培养液后，如果血清中的蛋白没有干扰，可以不用清洗。
- 2、如果裂解不充分可以适当增加裂解液的用量，如果需要高浓度的蛋白样品，可以适当减少裂解液的用量。
- 3、如果细胞量较多，必需分装成 50~100 万细胞/离心管，然后再裂解，大团的细胞较难裂解充分，而少量的细胞由于裂解液容易和细胞充分接触，相对比较容易裂解充分。
- 4、如果组织样品本身非常细小，可以适当剪切后直接加入裂解液裂解，通过强烈 Vortex 使样品裂解充分，然后同样离心取上清用于后续实验，直接裂解的优点是比较方便，不必使用匀浆器，缺点是不如使用匀浆器裂解的充分。
- 5、Enhanced RIPA Lysis Buffer 含有特殊成分，在低温情况下有可能出现浑浊现象，可 37°C 水浴促其溶解，不会影响使用效果；溶解时间不易过长，避免成分失效，4°C 保存即可，长期不用亦可 -20°C 保存。
- 6、PMSF 溶液可置 4°C 保存 1~2 周，-20°C 可保存 1 年以上，室温放置 2 天即可能失效。
- 7、裂解产物中经常会出现一小团透明胶状物，属正常现象，该透明胶状物为含有基因组 DNA 等的复合物，在不检测和基因组 DNA 结合特别紧密的蛋白的情况下可以直接离心取上清用于后续实验；如果需要检测和基因组结合特别紧密的蛋白，则可以通过超声处理打碎打散该透明胶状物，随后离心取上清用于后续实验。
- 8、细胞裂解的操作步骤，应置于冰上或 4°C 进行。

有效期：12 个月有效；低温运输，按要求保存。