

## 糖浆封片剂

### 产品简介

切片被夹于载玻片和盖玻片之间，其间用封固剂加以封闭，借以隔断切片与外界空气接触，这一操作过程称为封固，一方面可保存已染好的片子，另一方面可利用折射率适宜的封固剂使材料中的组织细胞清楚显示出来。

糖浆封片剂主要由糊精、糖、少量苯酚等组成，可以用于常规的各种切片、涂片等的封片，尤其适用于不能用乙醇及二甲苯处理的材料(如制作显示乳汁管的橡胶制片)。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	Storage
	糖浆封片剂	ADS088IH0
使用说明书	1 份	

### 自备材料

- 1、载玻片
- 2、盖玻片
- 3、显微镜

### 操作步骤(仅供参考)

#### 1、细胞样本

- ①染色结束后，吸干净液体。
- ②滴加 1~2滴糖浆封片剂载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触糖浆封片剂，尽量避免产生气泡。
- ③显微镜下观察。

#### 2、组织切片

- ①染色完成后，吸去染色液。
- ②滴 1~2滴糖浆封片剂于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片剂，尽量避免产生气泡。
- ③在显微镜下观察组织切片。

#### 3、其它样品（如病原真菌、昆虫等）

其它样品参考线虫样品或组织切片进行操作。

### 注意事项

- 1、封片样品宜避光保存。
- 2、封片剂在温度较低时呈固态，使用前须在37-50℃温育，并在完全溶解后使用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**6个月有效。低温运输，4℃保存。

