

## 免疫染色二抗稀释液

### 产品简介:

免疫染色二抗稀释液(Immunol Staining Secondary Antibody Dilution Buffer)可以用于非荧光免疫染色时二抗(secondary antibody)的稀释, 经免疫染色(非荧光)二抗稀释液稀释的二抗可以在 1 ~ 2 周内重复使用 2 ~ 4 次, 按照每个二抗稀释 10ml 计算, 100ml 免疫染色二抗稀释液可以稀释 10 次二抗。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	ADS133IH0	Storage
	免疫染色二抗稀释液		100ml
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、参考所用的二抗的说明书, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例, 例如 1:1000 ~ 1:500 稀释二抗。
- 2、二抗稀释后即可直接用于非荧光免疫染色。
- 3、一次免疫染色结束后, 可以回收稀释的二抗, 4°C 保存, 以用于下次的免疫染色。

### 注意事项:

- 1、为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4°C 进行二抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓二抗的衰减速度。
- 2、本免疫染色二抗稀释液经过滤除菌处理, 使用过程中应尽量避免细菌污染。
- 3、一旦启用后建议在一个月内用完, 如果发现有沉淀或细菌污染请弃用。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 5、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月。低温运输, 4°C 保存。