

# 黑色素清除液

## 产品简介

传统的从切片去除黑色素的方法有苦味酸、氢氧化钠、氢氧化钾等方法,但以上方法有可能影响后续染色过程,黑色素清除液相较以上方法对组织的损伤更小,色素沉着也较少。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

|              | 编号 | ADS055DZ0 | Storage |
|--------------|----|-----------|---------|
| 名称           |    | 2×100ml   |         |
| 试剂(A1):清除液 A |    | 50ml      | RT 避光   |
| 试剂(A2):清除液 B |    | 50ml      | RT      |
| 试剂(B): 漂白剂   |    | 100ml     | RT      |
| 使用说明书        |    | 1 份       |         |

#### 操作步骤(仅供参考)

- 1、切片常规脱蜡至水,镜下观察黑色素的量有多少和颜色的深浅。
- 2、配制黑色素清除液:清除液 A 和清除液 B 等比例混合,现用现配,不可久存。
- 3、切片入黑色素清除液处理20min~4h(见注意事项1),蒸馏水冲洗干净。
- 4、入漂白剂处理 2~5min。
- 5、水洗, 镜下观察色素是否除去, 如未去除干净, 重复 3~4 步骤。
- 6、进行下游染色或免疫组化染色。

#### 注意事项

- 1、应根据福尔马林色素的量,调整处理时间。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

**有效期**: 12 个月。