

Hoagland's(霍格兰氏)营养液-大量元素(100×)

产品简介

植物组织培养技术即植物无菌培养技术，又称离体培养技术，是根据植物细胞具有全能性的理论，利用植物体离体的器官(如根、茎、叶、花、茎尖、果实等)、组织(如形成层、表皮、表层、髓部细胞、胚乳等)或细胞(大孢子、小孢子、体细胞等)以及原生质体，在细菌和适宜的人工培养基及环境条件下，能够诱导出愈伤组织、不定芽、不定根、最后形成完整菌株的技术。在配制培养基前，为了使用方便、简化操作、用量准确，减少每次配药称量各种化学成分所花费的时间和误差，常将配制培养基所需无机大量元素、微量元素、铁盐、有机物、激素成分分别配制成比需要量大若干倍的浓缩母液，当配制培养基时按预先计算好的量分别吸取各种母液即可。

Hoagland's(霍格兰氏)营养液-大量元素(100×)主要由磷酸二氢铵、硝酸盐、硫酸镁、磷酸盐等组成，其中硝酸钙工作浓度为 945mg/L、硝酸钾工作浓度为 607mg/L、硫酸镁工作浓度为 493mg/L，使用时按比例稀释即可使用，主要用于培养植物组织，检测植物生长速率。2×50ml 包装正常情况下可配制 5L 的 Hoagland's(霍格兰氏)营养液。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS120M0 2×50ml	ADS120M1 2×100ml	ADS120M2 2×500ml	Storage
试剂(A): 大量元素母液 A(100×)	50ml	100ml	500ml	4°C
试剂(B): 大量元素母液 B(100×)	50ml	100ml	500ml	4°C
使用说明书	1 份			

自备材料

- 1、蒸馏水、稀酸、稀碱、铁盐母液(400×)、微量元素母液(400×)
- 2、pH 计、磁力搅拌器、烧杯

操作步骤(仅供参考)

- 1、按试剂(A): 试剂(B): 铁盐母液(400×): 微量元素母液(400×): 蒸馏水=4: 4: 1: 1: 390(共 400 份)的比例充分混匀，调节 pH 至 5.5~5.9，即为 Hoagland's 营养液。4°C 保存 1 个月有效。
- 2、如需做半剂量(1/2 剂量)，按试剂(A): 试剂(B): 铁盐母液(400×): 微量元素母液(400×): 蒸馏水=2: 2: 1: 1: 390(共 400 份)的比例充分混匀，调节 pH 至 5.5~5.9，即为 1/2 Hoagland's 营养液。

- 3、如需做 1/4 剂量，按试剂(A)：试剂(B)：铁盐母液(400×)：微量元素母液(400×)：蒸馏水=1：1：1：1：390(共 400 份)的比例充分混匀，调节 pH 至 5.5~5.9，即为 1/4 Hoagland's 营养液。

注意事项

- 1、要根据不同的材料、不同的物种，选择合适的培养基，最好通过实验获得。
- 2、营养液 pH 值以 5.0~6.5 为宜。
- 3、如需严格无菌，可 121℃高压灭菌 15~20min。

有效期：12 个月；常温运输，4℃保存。