

Ehrlich 试剂

产品简介

细菌的生化试验(也称生化反应)是指由于不同细菌具有各自的酶系统,对底物的分解能力不同,由此产生的代谢产物也不同,通过生物化学的方法测定这些代谢产物的过程,生化试验主要包括碳水化合物的生化试验、氨基酸和蛋白质的代谢试验、碳源和氮源的利用试验、酶类的代谢试验等,不同的细菌对蛋白质的分解能力不同,一般先由胞外酶把蛋白质分解为短肽或氨基酸,侵入细菌体内后由胞内酶把肽类分解为氨基酸,这一分解过程可以通过氨基酸和蛋白质的代谢试验来检测,其中吲哚试验就是典型的过氨基酸和蛋白质的代谢试验,常见的吲哚试验方法有试管法(Kovac 法、Ehrlich 法)和点状法。

Ehrlich 试剂又称欧氏试剂、吲哚试验试剂或靛基质试验试剂,其有效成分为对二甲氨基苯甲醛,吲哚试验原理是某些具有色氨酸酶的细菌能够分解蛋白胨水中的色氨酸生成吲哚(靛基质),吲哚与对二甲氨基苯甲醛结合,形成红色化合物-玫瑰吲哚,Ehrlich 试剂特别适用于肠杆菌科细菌、非发酵菌、寄养性细菌、厌氧菌的鉴定。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

| 名称 | 编号 | | | Storage |
|-----------------|---------------|-------|-------|---------|
| | ADS039DM0/1/2 | | | |
| Ehrlich Reagent | 10ml | 100ml | 500ml | RT 避光 |
| 使用说明书 | 1 份 | | | |

自备材料

- 1、试管、胶头滴管、恒温培养箱、胰胨培养基、乙醚或二甲苯

操作步骤(仅供参考)

- 1、将待检细菌接种于胰胨培养基,置于恒温培养箱 35 ~ 37°C 培养 24 ~ 48h。
- 2、沿试管壁缓慢加入 1ml 乙醚或二甲苯,摇匀试管以便提取和浓缩吲哚,待其浮于培养基表面。
- 3、沿试管壁缓慢加入数滴 Ehrlich Reagent,观察其与培养基接触面的颜色变化。

注意:加入 Ehrlich Reagent 后不宜再摇动,否则液体界面被混合,导致红色不明显。

染色结果

| | |
|----|-------|
| 阳性 | 红色 |
| 阴性 | 无颜色变化 |

注意事项

- 1、培养细菌时，注意避免交叉污染。
- 2、Ehrlich 试剂有腐蚀性，请小心操作。
- 3、为了您的安全，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月。

