

脯氨酸（PRO）含量测定试剂盒说明书

（货号:ADS-F-AJS004-96 分光法 96 样）

一、产品简介：

植物体内游离脯氨酸含量在一定程度上反映了植物的抗逆性，抗旱性强的品种往往积累较多的脯氨酸。因此测定脯氨酸含量可以作为抗旱育种的生理指标。另外，由于脯氨酸亲水性极强，能稳定原生质胶体及组织内的代谢过程，因而能降低凝固点，有防止细胞脱水的作用。在低温条件下，植物组织中脯氨酸含量增加，可提高植物的抗寒性，因此，亦可作为抗寒育种的生理指标。

当用磺基水杨酸提取植物样品时，脯氨酸便游离于磺基水杨酸的溶液中，然后与酸性茚三酮加热反应后形成红色物质，该红色物质在 520nm 处有最大吸收峰，进而通过比色法测定植物体内游离脯氨酸的含量。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 100mL×1 瓶	4°C保存	使用前摇匀。
试剂一	液体 60mL×1 瓶	4°C保存	若有沉淀，50°C水浴加热两分钟使其溶解，用前摇匀。
标准品	粉体 1 支	4°C保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）、恒温水浴锅、台式离心机、可调式移液器、冰醋酸（乙酸）、研钵、冰

四、脯氨酸（PRO）含量的测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备

① 组织样本：称取约 0.1g 组织（水分充足的样本可取 0.5g），加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆，转移至 1.5mLEP 管后，于 90°C水浴振荡提取 10min；25°C×12000 rpm，离心 10min，取上清，冷却后待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）提取液体积（mL）为1：5~10 的比例进行提取。

② 液体样本：取0.1mL 液体样本加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆，转移至 1.5mLEP 管后，于 90°C水浴振荡提取 10 分钟，12000rpm，25°C离心 10min，取上清，冷却后待测。

【注】：若增加样本量，可按照液体体积（mL）提取液体积（mL）为1：5~10 的比例提取。

2、上机检测

① 可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 520nm，蒸馏水调零。

② 在 EP 管中依次加入：

试剂名称（ μL ）	测定管	空白管（仅做一次）
-----------------------	-----	-----------

样本	300	
蒸馏水		300
冰醋酸	300	300
试剂一	600	600


置 95°C水浴中加热 30min (盖紧封口, 防止盖子爆开水分散失), 冷却至室温。吸取 800μL 澄清溶液于 1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm) 中, 于 520nm 处读取吸光值 A, $\Delta A = A - \text{测定-A 空白}$ 。

【注】: 1. 吸光度 ΔA 线性范围为 0.01-1.0, 若 ΔA 超过 1.0 可减少样本加样量 V_1 (如减至 150μL, 则冰醋酸相应增加) 则改变后的 V_1 需代入计算公式重新计算。

2. 若 ΔA 值低于 0.005, 可增加样本加样体积 V_1 (如增至 450μL, 则冰醋酸减至为 150μL), 或增加样本取样质量 W , 可改变后的 V_1 和 W 需带入公式重新计算。

五、结果计算:

1、标准曲线方程: $y = 0.1304x - 0.0071$; x 为标准品质量 (μg), y 为 ΔA 。



2、按样本质量计算:

$$\begin{aligned} \text{脯氨酸(Pro)含量}(\mu\text{g/g 鲜重}) &= [(\Delta A + 0.0071) \div 0.1304] \div (W \times V_1 \div V) \times D \\ &= 25.6 \times (\Delta A + 0.0071) \div W \times D \end{aligned}$$

3、按液体体积计算:

$$\begin{aligned} \text{脯氨酸(Pro)含量}(\mu\text{g/mL}) &= [(\Delta A + 0.0071) \div 0.1304] \div [V_2 \times V_1 \div (V + V_2)] \times D \\ &= 281.2 \times (\Delta A + 0.0071) \times D \end{aligned}$$

V ---提取液的总体积, 1mL; V_1 ---加入反应体系提取液的体积, 0.3mL; V_2 ---

液体样品量, 0.1mL; W ---样品质量, g;

D ---稀释倍数, 未稀释即为 1。

附: 标准曲线制作过程:

- 1 制备标准品母液 (1mg/mL): 标准品溶解在 1mL 蒸馏水中, 充分混匀。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品: 0, 4, 8, 12, 16, 20 $\mu\text{g/mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据测定管的加样表操作, 根据结果即可制作标准曲线。