

黄嘌呤氧化酶 (xanthione oxidase, XOD) 试剂盒说明书

(货号: ADS-F-YH003-48 分光法 48 样)

一、产品简介:

黄嘌呤氧化酶 (XOD, EC 1.17.3.2) 属需氧脱氢酶类, 是活性氧主要来源之一, 也是核苷酸代谢的关键酶之一。XOD 主要分布于哺乳动物的肝脏等组织中, 当肝功能受损时, XOD 大量释放到血清中, 对肝损害的诊断具有特异性的意义。

黄嘌呤氧化酶 (XOD) 催化黄嘌呤氧化生成尿酸和超氧阴离子自由基, 接着与显色剂反应生成有色物质, 通过检测有色物质的生成量多少即可计算得出 XOD 酶活性大小。

二、试剂盒组分与配制:

| 试剂名称 | 规格 | 保存条件 | 备注 |
|------|--------------|---------|--|
| 提取液 | 液体 60mL×1 瓶 | 4°C保存 | |
| 试剂一 | 粉体 mg×1 支 | -20°C保存 | 用前甩几下使粉剂落入底部, 再加 1.6mL 蒸馏水溶解备用。 |
| 试剂二 | 液体 40mL×1 支 | 4°C保存 | |
| 试剂三 | 粉体 5 支 | 4°C保存 | 临用前甩几下, 使粉剂落到底部, 每支加 0.1mL 试剂四振荡或超声溶解后, 再加 3.9mL 蒸馏水混匀使用 (务必加 0.1mL 试剂四溶解后再加水), 一周内用完。 |
| 试剂四 | 液体 0.7mL×1 支 | 4°C保存 | |

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm) 、低温离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

四、黄嘌呤氧化酶 (XOD) 的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备

① 组织样本:

取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 在 4°C 或冰浴进行匀浆(或使用各类常见匀浆器)。4°C×12000rpm 离心 10min, 取上清作为待测液。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量(g) : 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例进行提取

② 液体样本: 直接检测; 若浑浊, 离心后取上清检测。

2、上机检测

- ① 可见分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 450nm, 蒸馏水调零。
- ② 测定前将试剂一、二和三 25°C 水浴 5min 以上。
- ③ 试剂三每次加样前务必混匀, 保证试剂的均一性。
- ④ 在 EP 管中依次加入:

| 试剂名称 (μL) | 测定管 |
|-----------|-----|
| 样本 | 60 |
| 试剂一 | 30 |
| 试剂二 | 320 |

| | |
|---|-----|
| 试剂三 | 320 |
| 37°C避光孵育, 立即于 450nm 读取吸光值 A1, 30min 后读取 A2, $\Delta A = A2 - A1$ 。 | |

【注】：若 ΔA 在零附近徘徊，可延长反应时间 T（如增至 60min）或加大样本量 V1（如增加至 100 μ L，则试剂二相应减少），则改变后的反应时间 T 和样本量 V1 需代入计算公式重新计算。

五、结果计算：

1. 按样本鲜重计算：

酶活定义：37°C下每克组织样本每分钟催化产生 1nmol 有色物质为一个酶活单位 (U)。

$$\text{XOD 活性}(\text{U/g 鲜重}) = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V2 \times 10^9) \div (W \times V1 \div V) \div T = 13.1 \times \Delta A \div W$$

2. 按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：37°C下每毫克蛋白样本每分钟催化产生 1nmol 有色物质为一个酶活单位 (U)。

$$\text{XOD 活性}(\text{U/mg prot}) = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V2 \times 10^9) \div (V1 \times Cpr) = 13.1 \times \Delta A \div Cpr$$

3. 按液体体积计算：

酶活定义：37°C下每毫升样本每分钟催化产生 1nmol 有色物质为一个酶活单位 (U)。

$$\text{XOD 活性}(\text{U/mL}) = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V2 \times 10^9) \div V1 \times D = 13.1 \times \Delta A$$

V---提取液体积, 1 mL;

V1---加入反应体系中样本体积, 0.06ml;

d---光径, 1cm;

V2---反应体系总体积, 730 μ L = 7.3 × 10⁻⁴L;

ϵ ---甲臜物质的摩尔消光系数, 3.1 × 10⁴ L /mol/cm;

T---反应时间, 30min; W---样本质量, g;

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL ; 建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。