

## 谷草转氨酶/天冬氨酸氨基转氨酶(GOT/AST)试剂盒说明书

(货号: ADS-W-AJS002-96 微板法 96 样)

### 一、产品简介:

天冬氨酸氨基转移酶，俗称谷草转氨酶，缩写为 AST 或 GOT (EC 2.6.1.1) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，催化可逆氨基反应，是氨基酸代谢的重要酶。

谷草转氨酶/天冬氨酸氨基转氨酶(GOT/AST)催化天门冬氨酸和α-同戊二酸发生转氨基反应，生成谷氨酸和草酰乙酸，草酰乙酸进一步自行脱羧生成丙酮酸；丙酮酸可与 2,4-二硝基苯肼反应生成 2,4-二硝基苯腙，在碱性溶液中显棕红色；通过在 520nm 读取吸光值并计算出该酶活力大小。

### 二、试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求
提取液	液体 100mL×1 瓶	4°C保存
试剂一	液体 4mL×1 瓶	4°C保存
试剂二	液体 4mL×1 瓶	4°C保存
试剂三	液体 40mL×1 瓶	4°C保存
标准品	粉体 1 支	4°C保存

### 三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅/恒温培养箱、台式离心机、可调式移液器、研钵。

### 四、谷草转氨酶/天冬氨酸氨基转氨酶(GOT/AST)活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

#### 1、样本制备:

##### ① 组织样本:

取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm, 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量(g):试剂一体积(mL)为 1:5~10 的比例提取。

##### ② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；12000rpm, 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌或细胞数量( $10^4$  个):提取液体积(mL)为 500~1000:1 的比例提取。

##### ③ 血清（浆）样本：直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

#### 2、上机测定:

##### ① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 520nm。

② 可先做 2 个样本预测定，熟悉操作过程，并依据测出的吸光值 A 是否超出标准曲线的线性范围来做调整。

##### ③ 在 96 孔板中依次加入：


试剂名称 ( $\mu$ L)	测定管	对照管
样本	10	
试剂一	20	20
混匀，于 37°C 孵育 30min		
试剂二	20	20
样本		10

混匀, 于 37°C 孵育 10min		
试剂三	200	200
混匀, 25°C 孵育 10min, 于 520nm 处测定吸光值 A, △A=A 测定-A 对照 (每个样本做一个自身对照)。		

- 【注】1.若 A 测定超过 1.2, 可降低样本量 V1 (如 5μL, 另外 5μL 用蒸馏水补齐, 总体积 10μL 保持不变)。则改变后的加样体积 V1 需代入计算公式重新计算。  
 2.若△A 的值在零附近徘徊, 则可增加样本量 V1 (如 15μL, 则试剂一相应减少), 或增加样本取样质量 (W), 则改变后的加样体积 V1 和取样质量 W 需代入计算公式重新计算。

## 五、结果计算:

1、标准曲线方程:  $y = 0.0239x + 0.0016$ , x 为标准品摩尔质量 (nmol); y 是△A。



2、按样本蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克组织蛋白每分钟催化产生 1 nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT/AST(nmol/min/mg prot)} = [(\Delta A - 0.0016) \div 0.0239] \div (V1 \times Cpr) \div T = 139.5 \times (\Delta A - 0.0016) \div Cpr$$

3、按样本鲜重计算:

酶活定义: 每克组织每分钟催化产生 1nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT/AST(nmol/min/g 鲜重)} = [(\Delta A - 0.0016) \div 0.0239] \div (W \times V1 \div V) \div T = 139.5 \times (\Delta A - 0.0016) \div W$$

4、按细菌或细胞密度计算:

酶活定义: 每 1 万个细菌或细胞每分钟催化产生 1nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT/AST(nmol/min/10^4 cell)} = [(\Delta A - 0.0016) \div 0.0239] \div (500 \times V1 \div V) \div T = 0.28 \times (\Delta A - 0.0016)$$

5、血清 (浆) 活力计算:

酶活定义: 每毫升血清 (浆) 每分钟催化产生 1nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT/AST(nmol/min/mL)} = [(\Delta A - 0.0016) \div 0.0239] \div V1 \div T = 139.5 \times (\Delta A - 0.0016)$$

V---提取液体积, 1 mL;

V1---反应体系中样本体积, 0.01mL;

T---反应时间, 30 min; W---样本质量, g; 500---细胞或细菌总数, 万;

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL ; 建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。

附: 标准曲线制作过程:

- 制备标准品母液 (20μmol/mL) : 加 1mL 蒸馏水溶解标准品, 充分混匀。
- 把母液稀释成以下浓度: 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2μmol/mL。也可根据实际来调整浓度。
- 10μL 标准品+20μL 试剂一+20μL 试剂二, 混匀, 于 37°C 孵育 10min ; 再加 200μL 试剂三, 混匀, 25°C 孵育 10min, 于 520nm 处测定吸光值 A, 依据结果即可制作标准曲线。