

NADP-苹果酸酶 (Malic enzyme, NADP-ME) 试剂盒说明书

(货号:ADS-F-FM020-48 分光法 48 样)

一、产品简介:

苹果酸酶是生物体内重要的酶之一,广泛存在于动物、植物、细菌体中。是苹果酸代谢的关键酶。近年来植物 ME 活性测定较多,已经成为抗氧化研究的热点。该酶发挥作用需要辅酶因子的参与,依据辅酶因子的不同,分为 NADP-ME(EC 1.1.1.40)和 NAD-ME(EC 1.1.1.38)。

ME 的主要功能是催化苹果酸氧化脱羧产生丙酮酸和 CO₂,以及伴随 NAD(P)⁺的还原反应,NADP-ME 催化 NADP⁺还原成 NADPH,本试剂盒通过检测 NADPH 在 340nm 处的增加速率即可得出 NADP-ME 的酶活性大小。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 50mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	粉剂 1 支	-20°C保存	使用前甩几下或离心使试剂落入底部,再加 1.2mL 蒸馏水溶解。
试剂二	液体 20mL×1 瓶	4°C保存	
试剂三	粉剂 1 支	4°C保存	使用前甩几下或离心使试剂落入底部,再加 1.2mL 蒸馏水溶解。

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)、水浴锅、台式离心机、可调式移液器。

四、NADP-苹果酸酶(NADP-ME)活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

称取约 0.1g 组织,加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆。12000rpm,4°C离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例。

② 细菌/培养细胞:先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液,超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 20%或 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次);12000rpm,4°C离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】:若增加样本量,可按细菌/细胞数量(10⁴个):提取液(mL)为 1000~5000:1 的比例进行提取。

③ 液体样品:直接检测。若浑浊,离心后取上清检测。

2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 340nm,蒸馏水调零。

② 所有试剂放在 25°C水浴 10min;

③ 在 1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管
样本	40
试剂一	20
试剂二	680
试剂三	20
混匀,立即于 340nm 下读取 A1 值,室温 (25°C)下,3min 后读取 A2 值。ΔA=A2-A1。	

【注】若 ΔA 过小，可以延长反应时间 T（如：10min 或更长），或增加样本上样量 V1（如增至 60 μ L，则试剂二相应减少），重新调整的 T 或 V1 需代入计算公式重新计算。

五、结果计算：

1、按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：25 $^{\circ}$ C条件下，每毫克组织蛋白每分钟生成 1 nmol NADPH 定义为一个酶活单位。

$$\text{NADP-ME}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot})=[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_2 \times 10^9] \div (\text{Cpr} \times V_1) \div T = 1018.2 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

2、按样本鲜重计算：

酶活定义：25 $^{\circ}$ C条件下，每克组织每分钟生成 1 nmol NADPH 定义为一个酶活单位。

$$\text{NADP-ME}(\text{nmol}/\text{min}/\text{g 鲜重})=[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_2 \times 10^9] \div (W \times V_1 \div V) \div T = 1018.2 \times \Delta A \div W$$

3、按细菌/细胞密度计算：

酶活定义：25 $^{\circ}$ C条件下，每 1 万个细菌/细胞每分钟生成 1nmol NADPH 定义为一个酶活单位。

$$\text{NADP-ME}(\text{nmol}/\text{min}/10^4 \text{ cell})=[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_2 \times 10^9] \div (V_1 \div V \times 500) \div T = 2.04 \times \Delta A$$

4、按照液体体积计算：

酶活定义：25 $^{\circ}$ C条件下，每毫升液体每分钟生成 1nmol NADPH 定义为一个酶活单位。

$$\text{NADP-ME}(\text{nmol}/\text{min}/10^4 \text{ cell})=[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_2 \times 10^9] \div V_1 \div T = 1018.2 \times \Delta A$$

ϵ ---NADPH 摩尔消光系数， $6.22 \times 10^3 \text{ L}/\text{mol}$ ；

V---加入提取液体积，1 mL；

V1---加入样本体积，0.04mL；

V2---反应总体积， $760 \mu\text{L} = 7.6 \times 10^{-4} \text{ L}$ ；

T---反应时间，3min；

W---样本质量；

d---光径，1cm；

500---细菌或细胞总数，500 万；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。